УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО НПО «Уралбиовет»

Стариков Н.М.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению премикса «Премикс Лакто Драйв»

I. Общие сведения

Торговое наименование премикса: «Премикс Лакто Драйв» («Premiks Lacto Drive»).

Форма премикса, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения премикса: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав премикса: в 1 л содержатся: действующие вещества - 1,2 пропандиол (пропиленгликоль) – 27 – 33%; глицерин – 18 – 22%; пропионат кальция – 4,5 – 5,5%; вспомогательное вещество – вода очищенная до 100%. Расчетная обменная энергия в 1 л премикса 9,3 – 11,4 МДж.

Характеристики премиксаи показатели ее безопасности: суммарная массовая доля 1,2 пропандиола (пропиленгликоля) и глицерина – 45 – 55%; содержание пропионата кальция – 4,5 – 5,5%.
Не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.

Указание объема или массы премикса (в зависимости от формы премикса) в упаковке:
По 5, 10, 20 и 25 л в полимерные канистры.
На единице упаковки размещается: торговое наименование премикса, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем в единице упаковки, дата изготовления, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению премикса.

Описание внешнего вида премикса:
Прозрачная жидкость желтоватого цвета со слабым характерным запахом.

Срок годности премикса с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:
24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.
Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения премикса:
Хранить в закрытой упаковке организации-производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°С до 25°С и относительной влажности не более 75%.
Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах премикса

Биологические свойства премикса обусловлены входящим в её состав компонентами. Пропиленгликоль в рубце жвачных животных под воздействием ферментативных процессов превращается в основном в пропионовую кислоту. Пропионовая кислота всасывается в стенку рубца, затем с током крови поступает в печень, где включается в углеводный обмен,

что сопровождается повышением уровня глюкозы в крови и уменьшением содержания кетоновых тел. Глицерин быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте жвачных животных и в значительной степени доступен для промежуточного метаболизма в качестве глюкопластичного вещества, повышает содержание глюкозы в крови, снижает концентрацию жирных кислот в крови. Пропионат кальция положительно влияет на увеличение содержания кальция в крови, а также является дополнительным источником энергии.

III. Порядок и условия применения премикса

Назначение: Для восполнения дефицита энергии у новотельных коров.

Показания для применения: Дефицит энергии у новотельных коров.

Противопоказания для применения: Не установлены.

Возможные побочные действия: Побочных действий при применении премикса в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения: Премикс совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении премикса:
При работе с премиксом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с премиксом, а также использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, защитные очки, перчатки ПВХ, спецодежду. Людям с гиперчувствительностью к компонентам премикса следует избегать прямого контакта с ней. При попадании в глаза или на кожу – немедленно промыть большим количеством проточной воды. При любом несчастном случае обратиться к врачу, иметь при себе настоящую инструкцию или этикетку.

Режим дозирования:
- новотельным коровам – 1 л на голову.

Способы применения:
Премикс применяют индивидуально перорально с помощью резиновой бутыли для выпаивания жидкостей.

Продолжительность применения:
Однократно при проявлении признаков отела, повторно - сразу после отела.
При необходимости дополнительно выпаивать не ранее чем через 12 часов после последнего применения.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения премикса:
Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе премикса

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - разработчика:
ООО НПО «Уралбиовет», 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - производителя:
ООО НПО «Уралбиовет», 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО НПО «Уралбиовет», 620000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, в 2-х км на восток от пересечения Екатеринбургской автомобильной дороги и ул. Высоцкого.