СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

24 ИЮН 2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Сультримикс

(Организация-разработчик: ООО НПО «Уралбиовет»;623700, Свердловская обл., М. О. Березовский, г. Березовский, тер. Северной промзоны, зд. 16, пом. 205)

Номер регистрационного удостоверения:_____

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Сультримикс (Sultrimix).

Международное непатентованное наименование: сульфадиазин, триметоприм.

2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.

Сультримикс в 1 мл в качестве действующих веществ содержит 40 мг триметоприма, 200 мг сульфадиазина натрия, а в качестве вспомогательных веществ - N,N-Диметилацетамид, полиэтиленгликоль 200 и воду очищенную.

3. По внешнему виду Сультримикс представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета.

Срок годности Сультримикса при соблюдении условий хранения - 12 месяцев с даты производства.

Запрещается применять Сультримикс по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 50 мл в банки полимерные с винтовой горловиной и крышкой навинчиваемой, по 100,0 мл, 1,0 и 5,0 л в полимерные банки, бутылки или канистры соответствующей вместимости, укупоренные навинчивающимися пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия с пластмассовыми вкладышами или прокладками. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5°С до 25°С и относительной влажности

воздуха не более 75%.

6. Сультримикс следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Сультримикс отпускается по рецепту ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Сультримикс относится к фармакотерапевтической группе антибактериальные лекарственные средства группы сульфаниламиды в комбинациях.

10. Антибактериальный эффект препарата обусловлен синергизмом действия триметоприма и сульфадиазина натрия в отношении патогенных микроорганизмов: Streptococcus spp., Meningococcus spp., Listeria monocytogenes, Noeardia spp., Escherichia spp., Shigella spp., Salmonella spp., Enterobacter spp., Pasteurella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Proteus spp., Haemophilus spp., Bacillus spp., Actinomyces spp., Bordetella spp., Yersinia pestis, Brucella spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp.

Механизм действия обусловлен двойным блокирующим влиянием на метаболизм бактерий путем конкурентного антагонизма. Сульфадиазин натрия имеет сходство по своей химической структуре с парааминобензойной кислотой (ПАБК) и захватывается микробной клеткой, что препятствует синтезу дигидрофолиевой кислоты. Триметоприм обратимо ингибирует дигидрофолатредуктазу бактерий, нарушает синтез тетрагидрофолиевой кислоты из дигидрофолиевой, что приводит к нарушению образования пуриновых и пиримидиновых оснований, нуклеиновых кислот, подавляя тем самым рост и размножение микроорганизмов.

Компоненты Сультримикса обладают высокой биодоступностью (в особенности триметоприм), проходят через гематоэнцефалический барьер.

Выводится из организма преимущественно, с мочой, фекалиями и пометом, у яйценоской птицы - с яйцами.

Сультримикс по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Сультримикс применяют телятам, поросятам, цыплятам-бройлерам и индейкам с лечебной целью при бактериальных инфекциях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к триметоприму и сульфадиазину, в том числе при заболеваниях дыхательной и мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является

повышенная индивидуальная чувствительность к сульфаниламидам и триметоприму, а также наличие у животного печеночной и почечной недостаточности.

Запрещается применять птице, яйца которой используются в пищевых целях, а также жвачным животным после начала рубцового пищеварения.

13. При работе с Сультримиксом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Сультримиксом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Не допускается применение лекарственного препарата лактирующим и беременным самкам.

15. Сультримикс применяют перорально индивидуально или групповым способом с водой для поения в течение 5 суток из расчета:

- телятам (индивидуально) - 1 мл/10 кг массы животного;
- поросятам - 1 мл/10 кг массы животного с учетом суточной потребности в питьевой воде;
- цыплятам-бройлерам и индейкам - 1 мл/1 л воды для поения.

В период лечения поросята, цыплята-бройлеры и индейки должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток. Раствор Сультримикса с водой для поения можно хранить не более 24 часов.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Сультримикса в соответствии с настоящей инструкцией не установлено. В случае появления признаков аллергической реакции использование препарата прекращают и при необходимости назначают антигистаминные средства.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией не выявлены.

18. Сультримикс не следует применять одновременно с производными парааминобензойной кислоты, новокаином и другими местными анестетиками, а также витаминами группы В (никотинамид, фолиевая кислота, холин) из-за их антагонистического действия на сульфаниламиды. Запрещено применять лекарственный препарат с водой для поения, pH которой ниже 7,0.

19. Особенностей действия при первом применении Сультримикса и при его отмене не отмечено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение возобновляют в тех же дозировках и схеме лечения.

21. Убой на мясо разрешается не ранее чем: телят - через 9 суток, поросят - через 7 суток, цыплят-бройлеров через - 3 суток, индеек через 7 суток после последнего применения Сультримикса. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственногопрепарата для ветеринарного применения	1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (ИОС УрО РАН); 620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академическая,д.22/20 2. ООО НПО «Уралбиовет» Свердловская область, Березовский городской округ, город Березовский, Северная промзона, 16
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителей	ООО НПО «Уралбиовет»; 623700, Свердловская обл., М. О. Березовский, г. Березовский, тер. Северной промзоны, зд. 16, пом. 205

Директор ООО НПО «Уралбиовет» Н.М. Стариков

Российская Федерация г. Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Уралбиовет" ОГРН 1106671014339