СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
К.А. САВЕНКОВ
24 НОЯ 2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Триаминомицин Крипто

(Организация-разработчик: ООО НПО «Уралбиовет»,
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.112а)

Номер регистрационного удостоверения:
46-3-24.25-5401№ ПВР-3-24.25/04147

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Триаминомицин Крипто (Triaminomycin Crypto).

Международное непатентованное наименование: паромомицин.

2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.

Триаминомицин Крипто в 1 мл в качестве действующего вещества содержит паромомицин сульфат 200 мг (в пересчете на паромомицина основание - 140 мг), а также вспомогательные компоненты: бензиловый спирт, натрия метабисульфит и очищенную воду до 1 мл.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачный раствор от желтого до желто-коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 24 месяца с даты производства. Срок годности препарата после первого вскрытия первичной упаковки - 3 месяца.

Запрещается применение Триаминомицин Крипто по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 50 мл и 100 мл в банки полимерные с винтовой горловиной и крышкой навинчиваемой, по 1 л в полимерные банки, бутылки или канистры, по 5 л в канистры соответствующей вместимости, укупоренные навинчивающимися пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия с пластмассовыми вкладышами или прокладками. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%.

6. Триаминомицин Крипто следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Триаминомицин Крипто отпускается по рецепту ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: Триаминомицин Крипто относится к ветеринарным препаратам группы аминогликозидов.

10. Паромомицина сульфат относится к антибактериальным препаратам из группы аминогликозидных антибиотиков. Паромомицин активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Escherichia coli, Salmonella spp.,* а также некоторых простейших, включая *Cryptosporidium spp.*

Механизм действия антибиотика заключается в ингибировании синтеза белка микроорганизма посредством необратимой связи с рибосомой.

После перорального введения препарата паромомицина сульфат всасывается, обеспечивая высокие концентрации в желудочно-кишечном тракте и оказывая действие на слизистой и подслизистой оболочках. Паромомицин не подвергается биотрансформации и быстро выводится из организма, главным образом в неизмененном виде с фекалиями и частично с мочой.

Триаминомицин Крипто по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Триаминомицин Крипто назначают телятам, козлятам и ягнятам с неразвитым преджелудком для лечения желудочно-кишечных заболеваний бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к паромомицину, в том числе криптоспоридиоза.

12. Противопоказанием к применению Триаминомицина Крипто является повышенная индивидуальная чувствительность животного к паромомицину. Не применять в случае нарушения функции почек или печени. Не применять телятам, козлятам и ягнятам с развитым рубцовым пищеварением.

13. При работе с Триаминомицин Крипто следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Триаминомицин Крипто.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское

учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Препарат не предназначен для применения беременным и лактирующим животным.

15. Триаминомицин Крипто применяют телятам, козлятам, ягнятам перорально в дозе 2,5 мл препарата/10 кг м.т./сутки (что соответствует 35 мг паромомицина основания/кг м.т.) в течение 7 последовательных дней.

Для обеспечения правильной дозировки и предупреждения применения пониженной дозы, массу тела следует определить с наибольшей возможной точностью.

Для обеспечения правильной дозировки необходимо применять шприц или другое средство для орального применения, причем препарат вводят животному непосредственно через рот.

16. При применении Триаминомицин Крипто в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости проводят симптоматическое лечение.

17. Передозировка: паромомицин обладает высоким пределом безопасности. При передозировке Триаминомицин Крипто у животных может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

18. С учетом отсутствия анализа совместимости, Триаминомицин Крипто не следует применять одновременно с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой на мясо телят, ягнят разрешается не ранее, чем через 48 суток. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (ФГБУ ИОС УрО РАН); 620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академическая, д.22/20
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного	ООО НПО «Уралбиовет»; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112а

удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя

Директор ООО НПО «Уралбиовет» Н.М. Стариков