СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
_____ К.А. САВЕНКОВ
_____
24 ИЮН 2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Тилмагнум

(Организация-разработчик: ООО НПО «Уралбиовет»;623700, Свердловская обл., М. О. Березовский, г. Березовский, тер. Северной промзоны, зд. 16, пом. 205)

Номер регистрационного удостоверения:_____

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Тилмагнум (Tilmagnum).

Международное непатентованное наименование: тилозин.

2. Лекарственная форма: гранулы для орального применения.

Тилмагнум в одной упаковке в качестве действующего вещества содержит 550 г тилозина тартрата, что соответствует 500 г тилозина, или 1,1 кг тилозина тартрата, что соответствует 1 кг тилозина.

3. По внешнему виду Тилмагнум представляет собой гранулы от белого до светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 24 месяца с даты производства. После первого вскрытия заводской упаковки лекарственный препарат рекомендуется использовать в течение 84 суток.

Запрещается применение Тилмагнум по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 550 г и 1,1 кг в полимерные банки соответствующей вместимости, укупоренные пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия или в пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5°С до 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%.

6. Тилмагнум следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Тилмагнум отпускается по рецепту ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Тилмагнум относится к антибактериальным препаратам группы макролидов.

10. Тилозин, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе стафилококков, стрептококков, коринебактерий, клостридий, пастерелл, эризипелотриксов, спирохет, хламидий, трепонем и микоплазм. Механизм бактериостатического действия тилозина тартрата заключается в подавлении синтеза белка на рибосомальном уровне.

При пероральном введении тилозин хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальных концентраций в крови в течение 1 – 3 часов, проникает в большинство органов и тканей организма. Терапевтическая концентрация антибиотика после однократного применения лекарственного препарата в рекомендованных дозах сохраняется в организме в течение 15 - 24 часов. Тилозин выводится из организма преимущественно с фекалиями, в меньшей степени - через почки и с молоком.

По степени воздействия на организм Тилмагнум относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Тилмагнум применяют для лечения свиней и сельскохозяйственной птицы при желудочно-кишечных и респираторных бактериальных инфекциях, вызванных возбудителями, чувствительными к тилозину, в том числе энзоотической пневмонии свиней, вызываемой Mycoplasma hyorhinis и Mycoplasma hyopneumonia, дизентерии свиней, вызываемой Brachyspira hyodysenteriae и пролиферативной энтеропатии свиней (илеит), вызываемой Lawsonia intracellularis, а также микоплазмоза сельскохозяйственных птиц, вызываемого Mycoplasma synoviae и Mycoplasma gallisepticum.

12. Противопоказанием к применению Тилмагнума является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата.

Запрещается применять лекарственный препарат курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 14 дней до начала яйцекладки в связи с накоплением тилозина в яйцах.

13. При работе с Тилмагнумом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тилмагнумом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать

для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Особенностей применения Тилмагнума у беременных животных, у животных в период лактации и у потомства животных не установлено.

15. Тилмагнум применяют свиньям и сельскохозяйственной птице перорально индивидуально или групповым способом с водой для поения.

Лекарственный препарат применяют свиньям в суточной дозе: для лечения энзоотической пневмонии - 22 мг Тилмагнума на кг массы тела животного (соответствует 20 мг тилозина на кг массы тела животного) в течение 10 дней; для лечения илеита или пролиферативного аденоматоза - 5,5 - 11 мг Тилмагнума на кг массы тела животного (соответствует 5 - 10 мг тилозина на кг массы тела животного) в течение 7 дней.

С лечебно-профилактической целью птице лекарственный препарат применяют в суточной дозе 82,5 – 110 мг Тилмагнума на кг массы тела животного (соответствует 75 – 100 мг тилозина на кг массы тела животного) в течение 3 - 5 дней; для лечения некротического энтерита - 22 мг Тилмагнума на кг массы тела животного (соответствует 20 мг тилозина на кг массы тела животного) в течение 3 дней.

В период лечения свиньи и птица должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат.

Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток. Перед применением рекомендованную дозу Тилмагнума растворяют в небольшом количестве воды (воду добавляют к лекарственному препарату), а затем разводят с водой до необходимой концентрации.

Раствор Тилмагнума с водой для поения можно хранить не более 24 часов.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При применении Тилмагнума у свиней возможны аллергические реакции на тилозин, проявляющиеся в виде легкого отека прямой кишки, эритемы, зуда и респираторных явлений, которые быстро проходят после прекращения применения лекарственного препарата. Если в течение 2-3 дней не произойдет заметного клинического улучшения, рекомендуется провести повторную проверку чувствительности микроорганизмов, выделенных от больных животных и птицы, к тилозину или заменить Тилмагнум на другой антибактериальный препарат.

17. Симптомы передозировки могут проявляться нарушениями функции желудочно-кишечного тракта.

18. Лекарственные взаимодействия не установлены. Не следует применять Тилмагнум одновременно с антибиотиками группы фениколов и антибиотиками группы линкозамидов из-за возможного антагонистического эффекта.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой свиней и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 5 дней после последнего применения Тилмагнума. Мясо свиней и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (ИОС УрО РАН); 620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академическая,д.22/20 2. ООО НПО «Уралбиовет»; 623700, Свердловская обл., М. О. Березовский, г. Березовский, тер. Северной промзоны, зд. 16, пом. 205
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителей	ООО НПО «Уралбиовет»; 623700, Свердловская обл., М. О. Березовский, г. Березовский, тер. Северной промзоны, зд. 16, пом. 205

Директор ООО НПО «Уралбиовет» Н.М. Стариков