СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

А. САВЕНКОВ

06 ИЮЛ 2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Аквахинол

Организация-разработчик: ООО НПО «Уралбиовет», 623700, Свердловская обл., М. О. Березовский, г. Березовский, тер. Северной промзоны, зд. 16, пом. 205)

Номер регистрационного удостоверения:_____

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Аквахинол (Aguachinol). Международное непатентованное наименование: энрофлоксацин.

Международные непатентованные наименования: энрофлоксацин.

2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.

Аквахинол в 1 мл в качестве действующего вещества содержит энрофлоксацин - 100 мг и вспомогательные вещества: уксусную кислоту, натрия бензоат и воду очищенную.

3. По внешнему виду Аквахинол представляет собой прозрачную жидкость от желтого до желто-зеленого цвета.

Срок годности Аквахинол при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 12 месяцев с даты производства, после первого вскрытия упаковки - 7 суток.

Запрещается применение Аквахинола по истечению срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 50 мл в банки полимерные с винтовой горловиной и крышкой навинчиваемой, по 100 мл, 1,0 и 5,0 л в полимерные банки, бутылки или канистры соответствующей вместимости, укупоренные навинчивающимися пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия с пластмассовыми вкладышами или прокладками. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 5°С до 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%.

6. Аквахинол следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается по рецепту ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Аквахинол относится к антибактериальным препаратам производным нафтиридина, хинолонов, фторхинолонов.

10. Энрофлоксацин, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе: Escherichia coli, Homophiles, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, Bordetella, Campylobacter, Corynebacterium, Pseudomonas, Proteus, а также Mycoplasma spp.

Механизм действия энрофлоксацина заключается в ингибировании бактериальной ДНК- гиразы. При пероральном введении Аквахинола энрофлоксацин хорошо и быстро всасывается, проникает в большинство органов и тканей. Выводится из организма животных преимущественно в неизменном виде и, частично, в виде метаболитов, в основном с мочой и желчью и в небольших количествах с фекалиями.

При пероральном введении препарата энрофлоксацин легко всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает в кровь, большинство органов и тканей. Максимальная концентрация энрофлоксацина в крови достигается через 1,5 - 2,0 часа, терапевтическая концентрация сохраняется в течение 24 часов после введения лекарственного препарата. Выводится энрофлоксацин из организма птиц с пометом в основном в неизменном виде и в виде метаболита - ципрофлоксацина.

Аквахинол по степени воздействия на организм относится к "веществам малоопасным" (4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Аквахинол назначают цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индейкам при колибактериозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, некротическом энтерите, кампилобактерийном гепатите, гемофилезе, микоплазмозе и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину.

12. Противопоказанием для применения препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к фторхинолонам. Запрещается применение Аквахинола курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением энрофлоксацина в яйцах.

13. При работе с Аквахинолом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной

воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Аквахинолом.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Аквахинол не предназначен для применения млекопитающим животным.

15. Аквахинол применяют с водой для поения в суточной дозе 10 мг энрофлоксацина на 1 кг массы птицы, что соответствует:

- птицам до 4-недельного возраста - 5 мл препарата на 10 л воды;
- птицам старше 4-недельного возраста - 10 мл препарата на 10 л воды.

Продолжительность курса лечения - 3-5 суток, при лечении сальмонеллеза и смешанных инфекций - 5 суток.

В период лечения вода с лекарственным препаратом должна служить единственным источником питья для птиц. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птицей в течение суток.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты.

17. При передозировке препарата у птиц возможны нарушения функции желудочно-кишечного тракта и уменьшение потребления корма, аллергические реакции.

18. Не допускается применение Аквахинола одновременно с бактериостатическими антибиотиками (левомицетином, макролидами, тетрациклинами), теофилином, нестероидными противовоспалительными средствами, препаратами магния и кальция.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

21. Убой птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 8 суток после последнего применения лекарственного препарата. Мясо птиц, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки	1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического

производителя лекарственногопрепарата для ветеринарного применения	синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (ИОС УрО РАН) 620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академическая,д.22/20 2. ООО НПО «Уралбиовет» Свердловская область, Березовский городской округ, город Березовский, Северная промзона, 16
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителей	ООО НПО «Уралбиовет»623700, Свердловская обл., М. О. Березовский, г. Березовский, тер. Северной промзоны, зд. 16, пом. 205

Директор ООО НПО «Уралбиовет» Н.М. Стариков