УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПО «Уралбиовет»

_____ Стариков Н.М.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению в ветеринарии моюще-дезинфизирующего средства
«Серебряное копытце»

(Организация-производитель: ООО НПО «Уралбиовет», г. Екатеринбург)

I. Общие сведения

1. «Серебряное копытце» – моюще-дезинфизирующее средство для применения в ветеринарии.
2. Содержит в качестве действующих веществ: борную кислоту, сульфат меди, четвертичные аммонийные соединения, функциональные добавки и вспомогательные вещества: воду очищенную.
3. По внешнему виду представляет собой вязкую жидкость синего цвета с характерным запахом.
4. Выпускают расфасованным по 20 кг в канистры, укупоренные навинчивающимися пластмассовыми крышками с кольцом первого вскрытия с пластмассовыми вкладышами или прокладками, по 1000 кг в полимерных контейнерах.

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования и места нахождения изготовителя, названия средства, его назначения, массы нетто в единице упаковки, состава, номера партии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, рекомендаций по применению, стандарта организации, штрихового кода, информации о подтверждении соответствия.

Хранят в закрытой упаковке организации-производителя в защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от 5°С до 25°С.

Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Не использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства средства обусловлены входящим в его состав компонентами.

«Серебряное копытце» включает в свой состав нанокомпозит, представляющий собой смесь полимеров разной длины цепи — аминоэфиров борной кислоты. В качестве стабилизирующей добавки используются ПАВы (четвертичные аммонийные соединения), которые в свою очередь формируют наноразмерную коллоидную систему — мицеллы аминоэфиров борной кислоты. Сформированные мицеллы способствуют лучшему проникновению компонентов средства в ороговелые слои, увеличивают проникающую способность в клетку бактерий, простейших и грибов, что способствует повышению антисептического действия борной кислоты.

Бороорганические полимеры способствует фиксации активного компонента — сульфата меди на поверхности копытного рога крупного и мелкого рогатого скота и северных оленей, тем самым увеличивая время действия средства, дополнительно препятствуя повторной контаминации поврежденной ткани патогенными и условно-патогенными микроорганизмами.

Применение средства оказывает очищающее действие с дезинфицирующим эффектом на копытцевый рог крупного и мелкого рогатого скота и северных оленей, способствует предотвращению некробактериоза, папилломатозного пальцевого дерматита, межпальцевого дерматита и копытной гнили.

III. Порядок применения

6. «Серебряное копытце» применяют наружно для санации копытцевого рога крупного и мелкого рогатого скота с целью предотвращения некробактериоза, папилломатозного пальцевого дерматита, межпальцевого дерматита и копытной гнили.
7. Средство применяется наружно в форме 3-5% рабочего раствора для копытных ванн.

С целью предотвращения некробактериоза, папилломатозного пальцевого дерматита, межпальцевого дерматита и копытной гнили средство используется два раза в день в течение двух дней в неделю.

Как вспомогательное средство в схеме лечения при клинических показаниях:

- легкая форма поражения - один раз в день;
- тяжелая форма поражения - два раза в день, до положительных клинических показателей.

Для достижения наибольшего эффекта при использовании средства рекомендованная экспозиция 20—30 минут.

Готовый раствор средства должен обновляться каждый раз после обработки 200-250 голов крупного рогатого скота.

8. Побочных явлений и осложнений при применении средства в соответствии с инструкцией не выявлено.
9. Противопоказаний не установлено.
10. Продукцию животноводства после применения средства можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с «Серебряное копытце» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с моюще-дезинфицирующими средствами.
12. Людям с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать прямого контакта с ней. При попадании в глаза и на кожу – немедленно промыть большим количеством проточной воды. При любом несчастном случае обратиться к врачу, иметь при себе настоящую инструкцию или этикетку.
13. Хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика: ООО НПО «Уралбиовет», 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.

Наименование и адрес организации-производителя: ООО НПО «Уралбиовет», 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.